



| 年齢 | 米国小児学会推薦の予防接種（必須） | 米国小児学会推薦の予防接種（任意） |
|--------|---------------------------------|------------------------------|
| 新生児 | B型肝炎① | RSウイルス※ |
| 1ヶ月 | | |
| 2ヶ月 | B型肝炎② | □タ① |
| | 3種混合（ジフテリア・破傷風・百日咳）① | |
| | 筋注ポリオ① | |
| | ヒブ（H. influenza type B）① | |
| | 肺炎球菌① | |
| 4ヶ月 | 3種混合（ジフテリア・破傷風・百日咳）② | □タ② |
| | 筋注ポリオ② | |
| | ヒブ（H. influenza type B）② | |
| | 肺炎球菌② | |
| 6ヶ月 | B型肝炎③ | □タ③ |
| | 3種混合（ジフテリア・破傷風・百日咳）③ | |
| | 筋注ポリオ③ | |
| | ヒブ（H. influenza type B）③ | |
| | 肺炎球菌③ | |
| 9ヶ月 | | |
| 12ヶ月 | 肺炎球菌④ | |
| | 麻疹・おたふく・風疹① | |
| | A型肝炎① | |
| 15ヶ月 | 水疱瘡① | |
| | ヒブ（H. influenza type B）④ | |
| 18ヶ月 | 3種混合（ジフテリア・破傷風・百日咳）④ | |
| | A型肝炎② | |
| 4～6歳 | 3種混合（ジフテリア・破傷風・百日咳）⑤ | |
| | 筋注ポリオ④ | |
| | 水疱瘡② | |
| | 麻疹・おたふく・風疹② | |
| 9歳～ | | パピローマウイルス※ |
| 11～12歳 | 大人用3種混合 Tdap （ジフテリア・破傷風・百日咳） | |
| | 髄膜炎球菌① | |
| | | |
| 16歳 | 髄膜炎球菌② | |
| 毎年 | | インフルエンザ （月齢6ヶ月以上の全ての小児患者） |

※RSウイルスワクチン: RSウイルスの流行シーズン（10月～3月）に実施、且つ月齢が8カ月未満の乳児が対象

※HPVワクチン: 9～14歳は2回接種（0・6か月後）、15歳以上は3回接種（0・1～2・6か月後）

◆◆◆ 4歳以降は、毎年1回健康診断を受診することをお勧めします。◆◆◆